

## Hoja 2

1.- Dibujar las curvas de nivel y las gráficas de las siguientes funciones  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ .

$$\begin{array}{lll} (a) f(x, y) = x + y - 2 & (b) f(x, y) = x^2 + 4y^2 & (c) f(x, y) = -x^2y^2 \\ (d) f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2) & (e) f(x, y) = 1 + (x^2 + y^2) & (f) f(x, y) = x^2 - y^2 \\ (g) f(x, y) = \frac{y}{1+x^2} & (h) f(x, y) = \max\{|x|, |y|\} & (i) f(x, y) = \cos^2(x^2 + y^2) \end{array}$$

2.- Dibujar las superficies de nivel de las siguientes funciones  $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ .

$$\begin{array}{ll} (a) f(x, y, z) = x - y - z + 2. & (b) f(x, y, z) = x^2 + y^2. \\ (c) f(x, y, z) = \exp(x^2 + y^2 + z^2). & (d) f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2. \\ (e) f(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z. & (f) f(x, y, z) = xy. \end{array}$$

3.- En cada una de las funciones que siguen, se pide determinar los conjuntos de puntos  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  donde están definidas y donde son continuas.

$$\begin{array}{lll} (g) f(x, y) = x^4 + y^4 - 4x^2y^2. & (h) f(x, y) = \tan \frac{x^2}{y}. & (i) f(x, y) = \frac{1}{\log \sqrt{x^2 + y^2}}. \\ (j) f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}. & (k) f(x, y) = \frac{\cos x^2}{x - y}. & (l) f(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{array}$$

4.- Hallar los límites

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2 \sin y^2 + y^2 e^{-|x|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 \cos \frac{4xy}{5x^2 + 3y^2}, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow \infty} \frac{\max\{|x|, |y|\}}{\sqrt{x^4 + y^4}}.$$

5.- ¿Cuál de los siguientes límites existe?

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy}{5x^2 + 3y^2}, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \cos \frac{4xy}{5x^2 + 3y^2}.$$

6.- Sea

$$f(x, y) = \frac{x - y}{x + y}$$

definida para los  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  tales que  $x + y \neq 0$ . Demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right) = -1.$$

¿Existe el límite de  $f(x, y)$  cuando  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ ?

7.- Sea  $f(x, y)$  definida mediante

$$f(x, y) = \frac{x^2y^2}{x^2y^2 + (x - y)^2}$$

en los  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  tales que  $x^2y^2 + (x - y)^2 \neq 0$ . Demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right) = 0$$

y que no existe el  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ .

8.- Demostrar que la función

$$f(x, y) = \begin{cases} y \operatorname{sen} \frac{1}{x} + x \operatorname{sen} \frac{1}{y} & \text{si } x, y \neq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

tiene límite cuando  $(x, y)$  tiende a  $(0, 0)$  y que, sin embargo, no existen los límites iterados

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) \quad \text{y} \quad \lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right).$$

9.- Para cada  $(x, y) \neq (0, 0)$  se define

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

Hallar el límite de  $f(x, y)$  cuando  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  a lo largo de la rectas  $y = \lambda x$ . ¿Es posible definir  $f(0, 0)$  de modo que  $f$  sea continua en  $(0, 0)$ ?

10.- ¿Se pueden hacer continuas las funciones

$$f(x, y) = \frac{\operatorname{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

definiéndolas de forma adecuada en  $(0, 0)$ ?

11.- Se considera la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy - y}{(x - 1)^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (1, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (1, 0) \end{cases}$$

¿Es  $f$  continua en  $(1, 0)$ ?

12.- Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y \leq 0 \quad \text{ó} \quad y \geq x^2, \\ 1 & \text{si } 0 < y < x^2. \end{cases}$$

Demostrar que  $f(x, y) \rightarrow 0$  a lo largo de cualquier recta que pase por el origen. Hallar una curva que pase por el origen a lo largo de la cual (salvo en el origen)  $f(x, y)$  tiene el valor constante 1. ¿Es  $f$  continua en el origen?

13.- (\*) Existe el límite  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$  y es igual a 1. ¿Cierto o falso?

14.- Estudiar si son abiertos o cerrados los siguientes conjuntos, utilizando razonamientos con funciones continuas.

$$\begin{aligned} A &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 + 6y^2 = 30\}, \\ B &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1 + \operatorname{sen}^2(x + y)\}, \\ C &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^6 + 2y^2 + z^4 < 7\}, \\ D &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 1, \exp(x^2 + y^2 - 5) < e\}, \\ E &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 y \cos(xy) < x^2 - y^2 + 1\}. \end{aligned}$$

¿Son acotados o compactos algunos de ellos? ¿Cuáles?