

Determinantes.

1. Sea $A \in M_n(K)$ tal que $|A| = 9$. Determinar el determinante de las matrices A^5 , A^{-1} y $7A$.
2. Demuestra, sin calcularlos, que los siguientes determinantes son nulos (en algún caso conviene hacer alguna transformación).

$$(i) \begin{vmatrix} x & y & 2x+3y \\ 4 & 3 & 17 \\ z & t & 2z+3t \end{vmatrix}, \quad (ii) \begin{vmatrix} \operatorname{sen}^2 a & 1 & \operatorname{cos}^2 a \\ \operatorname{sen}^2 b & 1 & \operatorname{cos}^2 b \\ \operatorname{sen}^2 c & 1 & \operatorname{cos}^2 c \end{vmatrix}, \quad (iii) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}, \quad (iv) \begin{vmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & 5^2 \\ 3^2 & 4^2 & 5^2 & 6^2 \\ 4^2 & 5^2 & 6^2 & 7^2 \end{vmatrix}.$$

3. **Determinante de Vandermonde:** Sean $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$, demostrar la igualdad

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & & x_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i < j} (x_j - x_i)$$

(Sugerencia: Razonar por inducción. Empezar restando a cada columna la anterior multiplicada por x_1)

4. Escribir las siguientes permutaciones como producto de trasposiciones, calcular sus inversas y su signo:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad \sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

5. Demuestra que $(x-1)^3$ divide al polinomio
$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \end{vmatrix}.$$

6. Sabiendo que 58786, 30628, 12831, 80743 y 16016 son divisibles por 13, demostrar que

$$\begin{vmatrix} 5 & 8 & 7 & 8 & 6 \\ 3 & 0 & 6 & 2 & 8 \\ 1 & 2 & 8 & 3 & 1 \\ 8 & 0 & 7 & 4 & 3 \\ 1 & 6 & 0 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

es también divisible por 13.

7. Demostrar la igualdad para el determinante $n \times n$ siguiente

$$\begin{vmatrix} a-x & b & b & \dots & b \\ b & a-x & b & \dots & b \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & b & b & \dots & a-x \end{vmatrix} = (-1)^n (x - (a-b))^{n-1} (x - ((n-1)b + a)).$$

8. Calcula utilizando menores el rango de la matriz con coeficientes en \mathbb{R}

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & a-2 & 4 & a \\ 1 & a-1 & 2 & a^2 \end{pmatrix}.$$

9. Sea $A \in M_n(K)$. Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- (i) $|-A| = (-1)^n |A|$.
- (ii) $|\text{Adj}(A)| = |A|^{n-1}$.
- (iii) Si A es antisimétrica entonces $\det(A) = (-1)^n \det(A)$. En particular si n es impar, entonces $|A| = 0$.

10. Resolver usando la Regla de Cramer::

$$(i) \begin{cases} 3x + 2y + 4z = 1 \\ 2x - y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 1 \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} 3x + 2y + 4z + t = 1 \\ 2x - y + z - 3t = 6 \\ x + 2y + 3z - t = 1. \end{cases}$$

11. Sea $f : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ definida como

$$f \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 5b & b + 3c + 2d \\ c - d & d \end{pmatrix}$$

- (i) Calcular la matriz de f respecto de la base canónica de $M_2(\mathbb{R})$.
- (ii) Calcular la matriz de f respecto a la siguiente base de $M_2(\mathbb{R})$:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- (iii) Calcular los determinantes de las matrices halladas en los apartados (i) y (ii).

12. Calcula el determinante de los siguientes endomorfismos:

- (i) $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $f(z) = z - \bar{z}$, donde si $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$ es su conjugado, y vemos \mathbb{C} como un \mathbb{R} -espacio vectorial.
- (ii) $g : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ definida por $f(z_1, z_2) = (z_1 + z_2, z_1 + iz_2)$ visto como un homomorfismo de \mathbb{C} -espacios vectoriales y también visto como un homomorfismo de \mathbb{R} -espacios vectoriales.
- (iii) Consideramos el subespacio $W = \langle \sin(x), \cos(x) \rangle_{\mathbb{R}}$ del \mathbb{R} -espacio vectorial de las funciones de \mathbb{R} en \mathbb{R} . Calcula el determinante del endomorfismo de E definido por la derivación.

13. Sea $f : M_{2 \times 3}(\mathbb{C}) \rightarrow M_{2 \times 3}(\mathbb{C})$ el endomorfismo definido por

$$f \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 2b & 4c \\ 3a' & 3b' & 4c' \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{C}) \mid \begin{array}{l} a + b = 0 \\ a' + b' = 0 \\ c + c' = 0 \end{array} \right\}.$$

- (i) Demostrar que f induce un endomorfismo $f|_W : W \rightarrow W$ definido por la misma fórmula que f . Calcular su determinante.
- (ii) Probar que f induce también un endomorfismo \bar{f} del espacio cociente $M_{2 \times 3}(\mathbb{C})/W$. Calcular su determinante.
- (iii) Relacionar los determinantes de f , \bar{f} y $f|_W$.