

HOJA DE EJERCICIOS 1
Análisis Matemático.
CURSO 2020-2021.

Problema 1. Denotamos por $\|x\|$ la norma euclídea asociada al producto escalar en \mathbf{R}^N ,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^N x_i y_i.$$

Probar las dos identidades siguientes, y dar una interpretación geométrica:

- 1) *Identidad del Paralelogramo:* $2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2$.
 - 2) *Identidad de Polarización:* $4\langle x, y \rangle = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2$.
-

Problema 2. Sea (\cdot, \cdot) un producto escalar en \mathbf{R}^2 . Demostrar que existe una matriz simétrica tal que

$$((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Problema 3. Sea E un espacio vectorial real dotado de una norma $\|\cdot\|$ que satisface la *Identidad del paralelogramo* (ver ej.1). Definimos

$$B(x, y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Demostrar que $B(\cdot, \cdot)$ es un producto escalar en E .

Problema 4. Dadas las funciones definidas en \mathbf{R}^2 :

$$A(x, y) = \max\{2|x|, \sqrt{x^2 + y^2}\},$$

$$B(x, y) = \max\{|y|, |x - y|\},$$

- a) Demostrar que son normas en \mathbf{R}^2 .
 - b) Dibujar la bola unidad en cada una de ellas.
 - c) Comprobar que para $A(x, y)$ la desigualdad triangular puede ser una igualdad incluso para vectores linealmente independientes.
-

Problema 5. a) Comprobar que $d(x, y) = \min\{1, |x - y|\}$ define una distancia en \mathbf{R} , y que los abiertos asociados a d son los mismos que los asociados a la distancia usual $|\cdot|$.

b) Demostrar que la distancia d anterior no tiene asociada ninguna norma.

c) Sea E un espacio vectorial sobre \mathbf{R} sobre el que está definida una distancia d . Demostrar que son equivalentes:

- Existe una norma $\|\cdot\|$ en E tal que $d(x, y) = \|x - y\|$.
- La función d satisface:

$$\begin{cases} d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|d(x, y), \\ d(x + z, y + z) = d(x, y) \end{cases}$$

d) Repetir los apartados a) y b) con la función definida en \mathbf{R} :

$$D(x, y) = |x - y| + ||x| - |y||$$

Problema 6. (Este ejemplo se suele conocer por *French railway metric*. Dada la estructura de su red de ferrocarriles, los franceses suelen bromear diciendo que la mejor manera de ir de la ciudad A a la ciudad B es siempre pasar por París y hacer transbordo. La métrica siguiente reproduce esta idea.)

Definimos en \mathbf{R}^2 :

$$d(x, y) = \|x - y\|_2, \text{ si } y = tx \text{ para algún } t > 0,$$

$$d(x, y) = \|x\|_2 + \|y\|_2, \text{ en cualquier otro caso.}$$

a) Comprobar que d es una métrica en \mathbf{R}^2 .

b) Representar gráficamente la bola $B(x, r)$ asociada a esa métrica, para cada $x \in \mathbf{R}^2$ y para cada $r > 0$.

Problema 7. Sea $\{x_k\}_{k \in \mathbf{N}}$ una sucesión de puntos en \mathbf{R}^N tal que para todo k ,

$$\|x_{k+1} - x_k\| \leq r \|x_k - x_{k-1}\|,$$

para algún $r \in (0, 1)$. Demostrar que $\{x_k\}_{k \in \mathbf{N}}$ es convergente.

Problema 8. Consideramos en \mathbf{R}^n la norma

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

donde $1 \leq p < +\infty$.

- Dados $1 \leq p < q < +\infty$, demostrar que si $\|x\|_p \leq 1$ entonces $\|x\|_q \leq 1$.
- Demostrar que para todo $x \in \mathbf{R}^n$ se verifica $\|x\|_q \leq \|x\|_p$.
- Sea $\|x\|_\infty = \max\{|x_i| : i = 1, 2, \dots, n\}$. Demostrar que para todo $x \in \mathbf{R}^n$ se satisface:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$$

Indicación: Dividiendo por la norma infinito en los dos miembros, podemos asumir que $\|x\|_\infty = 1$. Separar las componentes con $|x_i| = 1$ de las componentes con $|x_i| < 1$, y usar (después de demostrarla) la desigualdad $|a^\alpha - b^\alpha| \leq |a - b|^\alpha$, $0 < \alpha < 1$, $0 < a, b \in \mathbf{R}$.

Problema 9. Sea $D : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ tal que:

- $D(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
- $D(x, y) \leq D(z, x) + D(z, y)$ para todo x, y, z .

Demostrar que D es una distancia en X .

Problema 10. Sea \bar{A} el cierre de un conjunto (es decir, la unión de A con sus puntos de acumulación). Demostrar las siguientes propiedades:

- $\bar{A} = \{x \in \mathbf{R}^N \mid \forall V_x, V_x \cap A \neq \emptyset\}$, siendo V_x un entorno abierto del punto x .
 - Si $A \subset B$ entonces $\bar{A} \subset \bar{B}$.
 - $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.
-

Problema 11. Discutir cuáles de los siguientes conjuntos son abiertos o cerrados:

- $\bigcap_{k=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{k}]$ en \mathbf{R} .
- $(0, 1) \cap \mathbf{Q}$ en \mathbf{R} .
- $\{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid 0 < x \leq y\}$ en \mathbf{R}^2 .
- $H = \{x \in \mathbf{R}^N \mid x_1 = 0\}$ en \mathbf{R}^N .
- $\{x \in \mathbf{R}^N : \|x\| = 1\}$ en \mathbf{R}^N .
- $\bigcup_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ en \mathbf{R} .

Determinar el interior, la frontera, los puntos de acumulación y la clausura (el cierre) de cada uno de los conjuntos anteriores.

Problema 12. Sea (X, d) un espacio métrico. Demuestra las propiedades siguientes, válidas para cualesquiera $a, b, c \in X, r, s > 0$:

- $|d(a, b) - d(b, c)| < d(a, c)$.
 - Si $a, b \in B(c, r)$, entonces $d(a, b) < 2r$.
 - Si $B(a, r) \cap B(b, s) \neq \emptyset$, entonces $d(a, b) < r + s$.
-

Problema 13. Sean $x \in \mathbf{R}^N$ y $A \subset \mathbf{R}^N$. Se define la distancia de x a A por

$$d(x, A) = \inf\{\|x - y\| : y \in A\}.$$

- Demostrar que para todos $x, y \in \mathbf{R}^n$ se cumple

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\|$$

- Sea $A_\epsilon = \{x \in \mathbf{R}^N \mid d(x, A) < \epsilon\}$. Probar que A_ϵ es abierto.
- Si se define $A^\epsilon = \{x \in \mathbf{R}^N \mid d(x, A) \leq \epsilon\}$, probar que es cerrado.
- Probar que A es cerrado si y sólo si $A = \bigcap_{\epsilon > 0} A^\epsilon$.

Problema 14. Demostrar que $A \subset \mathbf{R}^N$ es compacto si y sólo si cualquier subconjunto infinito de A tiene algún punto de acumulación que pertenece a A .

Problema 15. Discutir cuáles de los siguientes conjuntos son compactos

$$\begin{aligned} A &= \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : |x| + |y| < 1\} \\ B &= \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : |x| + |y| = 1\} \\ C &= \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : |x| + |y| \geq 1\} \end{aligned}$$

Problema 16. Sea $S^{N-1} = \{x \in \mathbf{R}^N : \|x\| = 1\}$. Sea $f : S^{N-1} \rightarrow \mathbf{R}$ una función continua. estudiar si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas:

- 1) $f(S^{N-1})$ es acotado.
- 2) $f(S^{N-1})$ es un abierto.

Si además se sabe que $f(S^{N-1}) \subset \mathbf{Q}$, estudiar qué se puede decir de f .

Problema 17. Demostrar que toda transformación lineal $T : \mathbf{R}^N \rightarrow \mathbf{R}^M$ es continua.

Problema 18. Dada una transformación lineal entre dos espacios métricos $T : X \rightarrow Y$, definimos su norma

$$\|T\| = \max_{\|x\|=1} \|Tx\|_Y.$$

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Hallar sus normas como operadores lineales en los siguientes casos:

- a) $A : (\mathbf{R}^2, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbf{R}^2, \|\cdot\|_2)$.
- b) $B : (\mathbf{R}^3, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbf{R}^2, \|\cdot\|_1)$.
- c) $B : (\mathbf{R}^3, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbf{R}^2, \|\cdot\|_2)$.
- d) $B : (\mathbf{R}^3, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbf{R}^2, \|\cdot\|_1)$.
- e) $B : (\mathbf{R}^3, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbf{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$.

f) *Ejercicio optativo adicional: conjeturar la fórmula que debe obtenerse para una matriz genérica de dimensión $N \times M$ en los casos d) y e) anteriores.*

Problema 19. Sea $A = (a_{ij}), i = 1, \dots, M; j = 1, \dots, M$ una matriz $N \times M$.

Interpretando $A : (\mathbf{R}^N, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbf{R}^M, \|\cdot\|_2)$, demostrar que

$$\|A\| = \sqrt{\lambda^*},$$

donde λ^* es el mayor de los autovalores de $A^T A$.

Indicación: la matriz $A^T A$ es simétrica, y por lo tanto diagonalizable en la base adecuada.

Problema 20. (Atención: es muy instructivo comparar este ejercicio con el anterior. NO es lo mismo.) Consideramos las matrices

$$A(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix},$$

como operadores $A : (\mathbf{R}^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbf{R}^2, \|\cdot\|_2)$.

- a) Demostrar que $\|A(a)\| \geq \sqrt{1+a^2}$.
- b) Calcular los autovalores de $A(a)$. Demostrar que no se puede estimar la norma $\|A(a)\|$ a partir de los autovalores obtenidos.
- c) Usar el resultado del ejercicio anterior para calcular el valor exacto de $\|A(a)\|$.