

HOJA DE EJERCICIOS 2  
Análisis Matemático.  
CURSO 2021-2022.

---

Sea  $f : (X, d) \rightarrow (Z, \rho)$  una aplicación entre espacios métricos.

Decimos que  $f$  es **Lipschitziana**, o simplemente **Lipschitz**, si existe una constante  $M \geq 0$  tal que

$$\rho(f(x), f(y)) \leq M d(x, y) \quad , \quad \text{para cualesquiera } x, y \in X ,$$

y de un tal número  $M$  decimos que es una **constante de Lipschitz para  $f$** .

Decimos que  $f$  es **localmente Lipschitziana**, o **localmente Lipschitz**, si para cada punto  $x_0 \in X$  existen un entorno  $U$  de  $x_0$  en  $X$  y un número  $M_U \geq 0$  tales que

$$\rho(f(x), f(y)) \leq M_U d(x, y) \quad , \quad \text{para cualesquiera } x, y \in U ,$$

es decir que la restricción  $f|_U$  es Lipschitz.

---

**Problema 1.** Demuestra que toda aplicación localmente Lipschitz es continua.

---

**Problema 2.** Determina, para cada una de la siguientes funciones continuas:

1. si es localmente Lipschitz o no,
2. si es Lipschitz o no.

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad x \mapsto x^2.$$

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad x \mapsto \sqrt{1+x^2}.$$

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad x \mapsto \arctan x.$$

$$(-1, 1) \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad x \mapsto \arcsen x.$$

$$[-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad x \mapsto \arcsen x.$$

$$(0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad x \mapsto \log x.$$

---

**Problema 3.** Sea  $L : (\mathbb{V}, \|\cdot\|) \rightarrow (\mathbb{W}, \|\cdot\|')$  una aplicación lineal entre dos espacios normados. Demuestra que son equivalentes:

1.  $L$  es continua en el punto  $\mathbf{0} \in \mathbb{V}$ .
  2.  $L$  es lineal acotada.
  3.  $L$  es Lipschitz para las distancias  $\|v_1 - v_2\|$  en  $\mathbb{V}$  y  $\|w_1 - w_2\|'$  en  $\mathbb{W}$ .
- 

**Problema 4.** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico. Fijado un punto  $a \in X$ , demuestra que la siguiente función

$$d_a : X \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad d_a(x) = d(x, a) ,$$

es Lipschitziana en  $(X, d)$ .

Deduce que, en todo espacio normado  $(\mathbb{V}, \|\cdot\|)$ , la norma es una función Lipschitz.

¿Cuál es la constante de Lipschitz para esas funciones?

---

**Problema 5.** Sea  $1 < p < \infty$ . Demuestra que para todo  $v \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\|v\|_\infty \leq \|v\|_p \leq \|v\|_1 \leq n \|v\|_\infty .$$

---

---

**Problema 6.** Sean  $\|\cdot\|$  y  $\|\cdot\|'$  dos normas en  $\mathbb{R}^n$ .

- Demuestra que un conjunto  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  es acotado para  $\|\cdot\|$  si y sólo si es acotado para  $\|\cdot\|'$ .
- Demuestra que si  $\{x_n\} \subset \mathbb{R}^n$  es una **sucesión de Cauchy** para  $\|\cdot\|$  (es decir, para cada  $\varepsilon > 0$  hay un  $k = k(\varepsilon)$  tal que  $n, m \geq k \implies \|x_n - x_m\| \leq \varepsilon$ ), entonces es una sucesión de Cauchy para  $\|\cdot\|'$ ; y viceversa.
- Dado cualquier subconjunto no vacío  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ , con las distancias  $d_E(x, y) = \|x - y\|$  y  $d'_E(x, y) = \|x - y\|'$ , y dada cualquier función  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ , demuestra que  $f$  es Lipschitz en  $(E, d)$  si y sólo si es Lipschitz en  $(E, d')$ .

---

**Problema 7.** Sean  $(X, d)$  un espacio métrico y  $A \subseteq X$  un subconjunto no vacío. Definimos la **distancia a A** como la siguiente función

$$\text{dist}(\cdot, A) : X \longrightarrow \mathbb{R} \quad , \quad \text{dist}(x, A) = \inf \{ d(x, y) : y \in A \} .$$

1. Demuestra que  $\text{dist}(\cdot, A)$  es una función Lipschitz en  $(X, d)$  ¿con qué constante de Lipschitz?
2. Si además  $A$  es compacto, demuestra que para todo  $x \in X$  existe  $a \in A$  tal que  $\text{dist}(x, A) = d(x, a)$ ; es decir, un **punto más cercano a x** entre los puntos de  $A$ .

---

**Problema 8.** Fijamos  $\mathbb{R}^n$ . Sea  $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)$  el primer vector de la base estándar. Demuestra que:

1. Los subconjuntos  $B(0, 1) \cup B(2\mathbf{e}_1, 1)$  y  $\overline{B}(0, 1) \cup \overline{B}(3\mathbf{e}_1, 1)$  no son conexos por caminos.
2. Los subconjuntos  $B(0, 1) \cup B(2\mathbf{e}_1, 1) \cup \{\mathbf{e}_1\}$  y  $\overline{B}(0, 1) \cup \overline{B}(3\mathbf{e}_1, 1) \cup \{t\mathbf{e}_1 : 1 < t < 2\}$  son conexos por caminos.

---

**Problema 9.** Sea  $(V, \|\cdot\|)$  un espacio normado.

- a) Dados  $x_0 \in V$  y  $r > 0$ , prueba que el cierre de la bola abierta  $B(x_0, r)$  es la bola cerrada  $\overline{B}(x_0, r)$ .
- b) Considera la distancia  $d(x, y) = \min\{\|x - y\|, 1\}$ . Demuestra que  $\|\cdot\|$  y  $d$  definen los mismos abiertos en  $V$  (y, por lo tanto, definen los mismos cerrados y el mismo concepto de cierre).
- c) Comprueba que se tiene  $B_d(\mathbf{0}, 1) = B_{\|\cdot\|}(\mathbf{0}, 1)$  pero el cierre de este conjunto no es la bola cerrada  $\overline{B}_d(\mathbf{0}, 1)$ .

---

**Problema 10.** a) Sea  $X$  conexo por caminos, y sea  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Determinar cómo es  $f$  si  $f(X) \subset \mathbb{Z}$ . Lo mismo para  $f(X) \subset \mathbb{Q}$ . Lo mismo para  $f(X) \subset \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ .

- b) Sea  $X$  conexo por caminos y  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua no constante. Demostrar que  $f(X)$  es no numerable.
- c) Demostrar que no existe ninguna función continua  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $f(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{R} - \mathbb{Q}$  y  $f(\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$ .

---

**Problema 11.** Sea  $(V, \|\cdot\|)$  un espacio normado. Dados subconjuntos  $A, B \subset V$ , se define

$$A + B = \{ a + b : a \in A, b \in B \}$$

- a) Demostrar que si  $A$  es compacto y  $B$  cerrado, entonces  $A + B$  es cerrado.
- b) Poner un ejemplo de un espacio  $V$  y dos cerrados  $A, B$  tales que  $A + B$  no es cerrado.

---

**Problema 12.** Sean  $(X, d_1), (Y, d_2)$  dos espacios métricos. Decimos que  $f : X \rightarrow Y$  es una **isometría** si satisface:

$$d_2(f(x), f(y)) = d_1(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in X .$$

Demuestra que toda isometría entre dos espacios métricos satisface:

- a) Es inyectiva.
- b) Es continua en  $X$ .
- c) La inversa  $f^{-1} : f(X) \rightarrow X$  también es isometría.

**Problema 13.** Sea  $(F, \|\cdot\|)$  un espacio normado.

a) Demuestra que toda aplicación lineal  $T : \mathbb{R} \rightarrow F$  es acotada, con  $\|T\| = \|T(1)\|$ .

b) Sea  $\mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$  el conjunto de las aplicaciones lineales  $T : \mathbb{R} \rightarrow F$ . Si definimos  $\phi : \mathcal{L}(\mathbb{R}, F) \rightarrow F$  mediante  $\phi(T) = T(1)$ , demostrar que  $\phi$  es una aplicación lineal y una isometría.

---

**Problema 14.** Para cada función analícese, en el punto  $(0, 0)$ , la continuidad, la existencia de derivadas parciales, la diferenciabilidad y la continuidad de las derivadas parciales.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 e^{-|x|}}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + 7y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \operatorname{sen} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

---

**Problema 15.** Considérese la siguiente función vectorial, definida en  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ ,

$$f(x, y) = \left( \frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right).$$

¿Es posible asignar un valor a  $f(0, 0)$  de forma que la  $f$  extendida sea continua en este punto?

Calcula la matriz de la diferencial  $Df(x, y)$ , respecto de las bases estándar en  $\mathbb{R}^2$ , en cada  $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ .  
Halla la función inversa de  $f$ .

---

**Problema 16.** Sea  $E$  un espacio vectorial dotado de un producto escalar  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  y de la norma asociada  $\|\cdot\|$ . Demuestra que la función  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = \|x\|^2$  es diferenciable en todo punto, y que

$$(Df)_x u = 2 \langle x, u \rangle \quad \text{para cualesquiera } x, u \in E.$$

---

**Problema 17.** Sean  $g_1, g_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  funciones continuas. Se define  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  mediante

$$f(x, y) = \int_0^x g_1(t, 0) dt + \int_0^y g_2(x, t) dt.$$

a) Probar que

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = g_2(x, y).$$

b) Hallar una función  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  tal que

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = x \quad \text{y} \quad \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = y.$$

c) Hallar una función  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  tal que

$$\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} = x^2 - 2y \quad \text{y} \quad \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} = e^z.$$

---

---

**Problema 18.** Se dice que una función  $f : \mathbb{R}^N \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  es homogénea de grado  $m$  cuando  $f(tx) = t^m f(x)$  para todo  $x \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$  y  $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Si una tal  $f$  es diferenciable, probar que

$$\langle \nabla f(x), x \rangle = m f(x) \quad \text{en cada } x \in \mathbb{R}^N.$$

---

**Problema 19.** Consideremos  $F : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$F(x, y) = \langle x, y \rangle,$$

producto escalar en  $\mathbb{R}^N$ .

a) Hallar  $DF(a, b)$ .

b) Si  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^N$  son diferenciables y  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  se define por  $h(t) = F(f(t), g(t))$ , calcular  $h'(t)$ .

c) Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^N$  diferenciable. Demostrar que  $\|f(t)\|$  es constante si y sólo si los vectores  $f(t)$  y  $f'(t)$  son ortogonales.

---

**Problema 20.** a) Calcular las diferenciales de  $f_1(x) = \langle a, x \rangle$ ,  $f_2(x) = \langle x, L(x) \rangle$  y  $f_3(x, y) = \langle x, L(y) \rangle$ , donde  $a \in \mathbb{R}^N$  es fijo,  $x, y \in \mathbb{R}^N$  son variables y  $L : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$  es una aplicación lineal.

b) Sea  $B : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  una aplicación bilineal. Calcular la aplicación lineal  $DB(x, y)$ .

c) Considérese la aplicación  $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida

$$f(x, y) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

Hallar la aplicación lineal  $Df(x, y)$ .

---

**Problema 21.** Dadas  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  y  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciables, utiliza la *regla de la cadena* para calcular las derivadas parciales de las siguientes funciones,

a)  $F(x, y, z) = f(h(x), g(x, y), z)$ ,

b)  $G(x, y, z) = h(f(x, y, z)g(x, y))$ ,

c)  $H(x, y, z) = g(f(x, y, h(x)), g(z, y))$ ,