

1.- Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales

- (i) $\frac{dx}{dt} = \sqrt{3t + 1}$, con $x = 1$ para $t = 0$.
- (ii) $\frac{dx}{dt} = \frac{tx}{1+t^2}$, con $x = 1$ para $t = 0$.
- (iii) $\frac{dy}{dx} = (y + 1)e^{-x}$, con $y = 2$ para $x = 0$.
- (iv) $\frac{dy}{dx} = x^2y^2$, con $y = 1$ para $x = 1$.

2.- La concentración de oxígeno $f(t)$ en un estanque contaminado con un residuo orgánico varía a lo largo del tiempo. La velocidad de variación viene dada por:

$$v(t) = \frac{t^2 - 1}{(t^2 + 1)^2} \quad (t = \text{"tiempo en semanas"}).$$

- a) Hallar la diferencia aproximada de concentración de oxígeno entre $t = 0$ y $t = 1$ utilizando la regla del trapecio con 4 subintervalos.
- b) Comparar el resultado aproximado con el exacto, sabiendo que

$$f(t) = \frac{t^2 - t + 1}{t^2 + 1}, \text{ para } t \geq 0.$$

3.- Un material radiactivo se elimina a una velocidad proporcional a la cantidad de material existente en cada momento. Su vida media es de 1200 años.

- (a) ¿Qué porcentaje de material radiactivo quedará después de 10 años?
- (b) ¿Cuántos años se requerirán para reducir la cantidad al 10%?

4.- Llamamos $x(t)$ a la proporción de individuos de una especie que existe en un instante t . Se sabe que la velocidad de crecimiento de x con respecto a t es proporcional a $x(1 - x)$. Resolver la ecuación diferencial correspondiente. ¿A qué modelo de función corresponde?

5.- De acuerdo con la ley de enfriamiento de Newton, la temperatura $T(t)$ de un objeto introducido en un ambiente más frío con temperatura constante A grados varía a una velocidad proporcional a $T(t) - A$ (el exceso de temperatura). Un médico forense mide la temperatura de un cadáver que resulta ser 29,4 grados centígrados. Dos horas después vuelve a medirla y resulta ser 23,3 grados centígrados. Si la temperatura ambiente es 20 grados centígrados ¿Cuánto tiempo hace que murió la persona contando desde la primera medición? (Nota: tomar como temperatura corporal en el momento del fallecimiento 36,7 grados centígrados.)

6.- Durante una epidemia de gripe en una población, la velocidad de propagación de la enfermedad, es decir, la velocidad de variación del número de enfermos es (aproximadamente): $v(t) = 1000 t e^{-0,5t}$ donde t es el número de días desde el inicio de la epidemia.

- (a) Utilizando la regla del trapecio con dos intervalos, calcula (aproximadamente) el número de individuos que se ponen enfermos durante los cuatro primeros días. Compara este valor con el valor exacto.
- (b) ¿En qué momento es máxima la velocidad de propagación de la gripe?

7.- La velocidad de variación de una población de bacterias con recursos limitados viene dada por la ecuación

$$\frac{dx}{dt} = -2(x - 5),$$

donde x es el “número de bacterias (en millones)” y t es el “tiempo transcurrido (en horas)”. Inicialmente hay 1 millón de bacterias.

- (a) Hallar la función que expresa x en función de t , resolviendo la ecuación diferencial.
- (b) ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 2 horas? ¿Cuántas habrá a largo plazo?