

## HOJA 6 DE PROBLEMAS

1. Para una función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  se define la traslación por  $y \in \mathbb{R}$  como  $(T_y f)(x) = f(x - y)$ , la modulación por  $z \in \mathbb{R}$  como  $(M_z f)(x) = e^{2\pi i x \cdot z} f(x)$  y la dilatación por un número real  $a > 0$  como  $(D_a f)(x) = f(ax)$ . Demostrar que si  $f \in L^1(\mathbb{R})$  se tiene:

$$a) \widehat{(T_y f)}(\xi) = (M_{-y} \widehat{f})(\xi) \quad b) \widehat{(M_z f)}(\xi) = (T_z \widehat{f})(\xi) \quad c) \widehat{(D_a f)}(\xi) = \frac{1}{a} (D_{a^{-1}} \widehat{f})(\xi)$$

2. a) Sea  $f(x)$  tal que  $\widehat{f}(\xi) = \pi e^{-2\pi|\xi|}$ ,  $\xi, x \in \mathbb{R}$ ; demostrar que  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ .

b) Si  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ , demostrar que  $f * f * f(x) = 3\pi^2 \frac{1}{9+x^2}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

c) Si  $g(x) = e^{10\pi i x} \frac{1}{9+x^2}$ , demostrar que  $\widehat{g}(\xi) = \frac{\pi}{3} e^{-6\pi|\xi-5|}$ ,  $x, \xi \in \mathbb{R}$ .

3. Sea  $a > 0$ . Probar que  $f(x) = e^{-a|x|} \in L^1(\mathbb{R})$  y calcular su transformada de Fourier.

4. Sean  $f(x) = \chi_{[-1/2, 1/2]}(x)$  y  $g(x) = (1 - |x|)\chi_{[-1, 1]}$ . Demostrar que

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{\operatorname{sen} \pi \xi}{\pi \xi} \quad \text{y} \quad \widehat{g}(\xi) = \left( \frac{\operatorname{sen} \pi \xi}{\pi \xi} \right)^2.$$

5. El siguiente ejercicio ilustra el principio de que el decaimiento de  $\widehat{f}$  está relacionado con la suavidad de  $f$ . Supongamos que  $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$  y que  $|\widehat{f}(\xi)| \leq C/|\xi|^{1+\alpha}$  cuando  $|\xi| \rightarrow \infty$  para algún  $\alpha \in (0, 1)$ . Demostrar que  $f$  satisface la condición de Hölder de orden  $\alpha$ , es decir  $|f(x+h) - f(x)| \leq M|h|^\alpha$  para algún  $M > 0$  y para todo  $x, h \in \mathbb{R}$ . (Indicación: con la fórmula de inversión de la transformada de Fourier expresar  $f(x+h) - f(x)$  como una integral que contiene a  $\widehat{f}$  y estimar esta integral separadamente en los conjuntos  $|\xi| \leq \frac{1}{|h|}$  y  $|\xi| > \frac{1}{|h|}$ .)

6. Sean  $f$  y  $g$  tales que  $|f(x)|, |g(x)| \leq C/(1 + \|x\|)^{n+\alpha}$ ,  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $\alpha > 0$ . Demostar que  $|f * g(x)| \leq C'/(1 + \|x\|)^{n+\alpha}$ , (Indicación: dividir la integral que define  $f * g(x)$  en dos trozos correspondientes a  $\|y\| \leq \|x\|/2$  y  $\|y\| > \|x\|/2$ .)

7. Sea  $\mathcal{F}_R(t) = R \left( \frac{\operatorname{sen} \pi t R}{\pi t R} \right)^2$  si  $t \neq 0$  y  $\mathcal{F}_R(0) = R$  el núcleo de Fejér en la recta real.

- a) Demostar que si  $f \in C_0(\mathbb{R})$ , entonces  $f * \mathcal{F}_R$  converge uniformemente a  $f$  cuando  $R \rightarrow \infty$ .
- b) Demostar que si  $f \in L^p(\mathbb{R})$ ,  $1 \leq p < \infty$ , entonces  $f * \mathcal{F}_R$  converge a  $f$  en la norma de  $L^p(\mathbb{R})$  cuando  $R \rightarrow \infty$ .

(Indicación: usar la función  $g$  del ejercicio 4 para demostrar que  $\{\mathcal{F}_R\}_{R>0}$  es una familia de núcleos de sumabilidad cuando  $R \rightarrow \infty$ .)

8. Demuestra que la periodización del núcleo de Fejér  $\mathcal{F}_N$  en la recta real (ver el ejercicio anterior) coincide con el núcleo de Fejér para funciones periódicas de periodo 1, es decir

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}_N(x+n) = F_N(x), \quad N = 1, 2, 3, \dots$$

donde

$$F_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left( \sum_{k=-n}^n e^{2\pi i kx} \right) = \sum_{n=-N}^N \left( 1 - \frac{|n|}{N} \right) e^{2\pi i n x} = \frac{1}{N} \left( \frac{\sin(N\pi x)}{\sin(\pi x)} \right)^2.$$

(Indicación: usar la fórmula de sumación de Poisson y la función  $g$  del ejercicio 4.)

9. a) Aplicar la fórmula de sumación de Poisson a la función  $g$  del ejercicio 4 para obtener  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n+\xi)^2} = \frac{\pi^2}{(\operatorname{sen} \pi \xi)^2}$ ,  $\xi \in \mathbb{R}$ ,  $\xi \notin \mathbb{Z}$ .  
 b) Utilizar el apartado a) para demostrar que  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n+\xi)} = \frac{1}{\operatorname{tg} \pi \xi}$ ,  $\xi \in \mathbb{R}$ ,  $\xi \notin \mathbb{Z}$ .
10. Sea  $G_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/4t}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $t > 0$ , el núcleo de Gauss en  $\mathbb{R}$ . Demostrar que  $D_0(G_t) = \sqrt{t}$  y  $D_0(\widehat{G_t}) = \frac{1}{4\pi\sqrt{t}}$ , donde  $D_0(f)$  es la dispersión de  $f \in L^2(\mathbb{R})$  alrededor de  $x = 0$ , es decir  $D_0(f) = \left( \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} / \|f\|_2$  (Indicación: usar que  $\widehat{(e^{-\pi x^2})}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$ .)
11. Sean  $A_n$  y  $V_n$  el área y el volumen de la esfera unidad y de la bola unidad en  $\mathbb{R}^n$ , respectivamente. Usar el cambio a coordenadas polares en  $\mathbb{R}^n$ , es decir,  $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^\infty \left( \int_{S^{n-1}} f(r\gamma) r^{n-1} d\sigma(\gamma) \right) dr$  para probar que  $A_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2})}$  y  $V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}$ , donde  $\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$ . (Indicación: usar que  $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi\|x\|^2} dx = 1$ .)
12. a) Sea  $T > 0$ . Probar que existe  $\psi \in L^1(\mathbb{R})$  tal que  $\psi * f = f$  para toda  $f \in L^2(\mathbb{R})$  con  $\operatorname{sop} \widehat{f} \subset [-T, T]$ .  
 b) Probar que no existe  $\psi \in L^1(\mathbb{R})$  tal que  $\psi * f = f$  para toda  $f \in L^2(\mathbb{R})$ .
13. (**Teorema de inmersión de Sobolev**) Para  $\alpha > 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ , se define el espacio de Sobolev de orden  $\alpha$  como

$$H^\alpha(\mathbb{R}) = \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^n) : C_f = \int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^\alpha)^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi < \infty \right\}.$$

Demostar que si  $f \in H^\alpha(\mathbb{R})$  con  $\alpha > 1/2$ , entonces  $f \in C_0(\mathbb{R})$ . (Indicación: demostar que  $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ .)