

Matrices y Determinantes.

1. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Calcula los valores de $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ para los que se cumple la igualdad $A^2 + \alpha A + \beta I = O$, donde I y O son respectivamente la matriz identidad y matriz nula, de orden dos.

2. Una matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se llama *idempotente* si $A^2 = A$. Demuestra lo siguiente:

a) La matriz $\begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ es idempotente.

b) Si A es idempotente, entonces $I - A$ es idempotente (I es la matriz identidad de orden n).

c) Si A es idempotente e invertible entonces A es la matriz identidad. Indicación: $A(I - A) = O$.

3. Calcula A^2, A^3, A^4 para

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Generaliza el resultado calculando A^n para $n \in \mathbb{N}$. Indicación: Intenta inferir el posible valor de A^n y demuéstralo por inducción.

4. Se dice que dos matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ *conmutan* si $AB = BA$. Encuentra todas las matrices que conmutan, respectivamente, con:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Decide de manera razonada si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas para A y B matrices cuadradas arbitrarias:

$$(AB)^2 = A^2B^2, \quad (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2, \quad (A + B)(A - B) = A^2 - B^2.$$

¿Qué ocurre con las anteriores igualdades si A y B conmutan?

6. Halla una matriz $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ cuya primera fila sea $(1/2, 1)$ y que coincida con su inversa.

7. Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Comprueba que $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I$ es la matriz nula.

8. Decide de manera razonada si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) La suma de matrices simétricas es una matriz simétrica.

b) El producto de matrices simétricas es una matriz simétrica.

9. Para $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se define su *traza* como $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$, esto es, la suma de los elementos de la diagonal principal. Demuestra que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(A^t B^t)$ se cumple para cualquier $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

10. Halla la forma escalonada reducida de cada una de las matrices. ¿Qué rango tienen estas matrices?

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 6 & 0 & 2/3 \\ 2 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & 3 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -6 & 3 & -9 & -6 & 3 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & -6 & -4 & 7 & -4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

11. Decide si las siguientes matrices son invertibles y, si lo son, halla su inversa utilizando el método de Gauss-Jordan:

$$\begin{pmatrix} 5\sqrt{2} & 3\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 9 & 2 & -1 & 2 \\ 10 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

12. Calcula los siguientes determinantes:

$$a) \begin{vmatrix} 4 & -2 & 5 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} \quad b) \begin{vmatrix} -4 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -4 \end{vmatrix} \quad c) \begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix} \quad d) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix}.$$

Solución: a) 63; b) 0; c) $(x - a)^3(3a + x)$; d) 5.

13. Halla los valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ que sean soluciones de las siguientes ecuaciones:

$$a) \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad b) \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad c) \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & -1 \\ 1 & -1 - \lambda & -1 \\ -2 & 3 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

14. Determina el rango de las matrices del ejercicio **10** usando determinantes.

15. Calcula la inversa de las dos primeras matrices del ejercicio **11** usando determinantes.