

**CONJUNTOS Y NÚMEROS. Curso 2011-2012.**  
**HOJA DE REPASO**

1. Calcular los últimos dos dígitos de  $2012^{2012}$ .

Indicación: Calcular primero el resto de dividir este número entre 25.

2. Demostrar que, dados  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , donde  $a$  y  $b$  son primos con  $n$ , la ecuación  $ax + by = c$  tiene exactamente  $n$  soluciones  $(x, y) \in \mathbb{Z}_n^2$ .

3. Hallar el conjunto de soluciones de cada uno de los siguientes sistemas en  $\mathbb{Z}_{10}$ .

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 5 \\ 2x + 9y = 1 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} 2x + 4y = 6 \\ x + y = 4 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} x + 3y = 1 \\ 3x - y = 3 \end{array} \right\}$$

4. Calcular: a)  $234^{432}$  (mód 11); b)  $145^{197}$  (mód 13); c)  $2025^{2025}$  (mód 14).

5. Sea  $(a, b, c)$  una terna pitagórica, esto es, una solución en  $\mathbb{Z}^3$  de la ecuación  $X^2 + Y^2 = Z^2$ . Demostrar lo siguiente:

i) al menos uno de los valores  $a, b$  o  $c$  es múltiplo de 3;

ii)  $abc$  es múltiplo de 4;

iii) al menos uno de los valores  $a, b$  o  $c$  es múltiplo de 5;

iv)  $abc \equiv 0 \pmod{60}$ .

Indicación: Estudiar qué números son cuadrados en  $\mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_4$  y  $\mathbb{Z}_5$ .

6. Demostrar que  $n(n^5 - 1)(n^5 + 1)$  es divisible por 22 para todo  $n \in \mathbb{Z}$ .

7. Hallar todas las soluciones de los siguientes sistemas de congruencias:

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv 13 \pmod{91} \\ x \equiv -1 \pmod{119} \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} x \equiv -5 \pmod{77} \\ x \equiv 17 \pmod{143} \end{array} \right\}$$

8. ¿Cuántas unidades hay en  $\mathbb{Z}_{2310}$ ? ¿y en  $\mathbb{Z}_{1764}$ ?

9. Verificar que si  $z, w \in \mathbb{C}$  entonces  $|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$ . Explicar el significado geométrico de esa igualdad, dibujando un par de puntos  $z, w$  en el plano complejo.

10. Descomponer los siguientes polinomios en factores irreducibles en  $\mathbb{Q}[X], \mathbb{R}[X], \mathbb{C}[X]$  y  $\mathbb{Z}_2[X]$ :

$$15X^2 - 19X - 8, \quad X^2 + 6X + 25, \quad X^3 + 6X^2 + 6X - 8, \quad 5X^3 + 9X^2 + 13X - 3, \quad 3X^3 + 2X^2 - 4X + 1.$$

Indicación: Son todos de grado menor o igual que 3.

11. Calcular el máximo común divisor  $\Delta(X)$  de los polinomios

$$P(X) = 2X^3 - 7X^2 + 10X - 6, \quad Q(X) = X^4 + 4.$$

Encontrar dos polinomios  $A(X)$  y  $B(X)$  tales que  $A(X)P(X) + B(X)Q(X) = \Delta(X)$ .

12. Se consideran polinomios  $P \in \mathbb{R}[X]$  de grado 5 tales que el máximo común divisor de  $P(X)$  y  $P(X + 1)$  es de grado 4.

a) Dar un ejemplo de polinomio que cumpla esta condición.

Indicación: Observar la relación que hay entre los ceros de  $P(X)$  y los de  $P(X + 1)$ .

b) Demostrar que si  $P, Q \in \mathbb{R}[X]$  son ambos de este tipo, entonces existen constantes  $a, b \in \mathbb{R}$  tales que  $Q(X) = aP(X + b)$ .

13. Para dos subconjuntos  $A, B$  de  $\mathbb{Z}$  cualesquiera, se suelen definir su suma y su producto de la siguiente forma:

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}, \quad A \cdot B = \{a \cdot b : a \in A, b \in B\}.$$

Sea  $n \in \mathbb{Z}_+$  y tomemos como  $A, B$  dos clases mod  $n$  :

$$A = \bar{a} = \{j : j \equiv a \pmod{n}\}, \quad B = \bar{b} = \{k : k \equiv b \pmod{n}\}$$

Comprobar si la definición de arriba da el mismo resultado que la definición de la suma y el producto de clases módulo  $n$ . Es decir, si los  $A+B, A \cdot B$  de arriba coinciden con las clases  $\overline{a+b}, \overline{a \cdot b}$  respectivamente.

Si alguna de estas igualdades no es cierta, estudiar si es cierta la inclusión en alguno de los dos sentidos.

14. Sean  $m, n \in \mathbb{Z}_+$  dos números primos entre sí. Escribimos  $r = \exp(2\pi i/m), s = \exp(2\pi i/n)$ .

i) Recordemos que  $1, r, r^2, \dots, r^{(m-1)}$  son todas las raíces  $m$ -ésimas de 1. Demostrar que los números  $1, r^n, r^{2n}, \dots, r^{(m-1)n}$  también son *todas las raíces  $m$ -ésimas de 1* (escritas en otro orden);

ii) Demostrar que  $\prod_{j=0}^{m-1} \prod_{k=0}^{n-1} (r^j + s^k)$  es igual a 2 o a 0, dependiendo de los valores de  $n$  y  $m$ . Decidir en qué casos vale 0 y en qué casos vale 2.

Indicación: Comprobar primero la fórmula  $\prod_{k=0}^{n-1} (z + s^k) = z^n - (-1)^n$ . Utilizar esta igualdad y el apartado (i).

15. Sea  $\mathcal{F}$  el conjunto de funciones de  $\mathbb{N} \setminus \{0\}$  a  $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ . Se define la siguiente relación en  $\mathcal{F}$  :

$$f \mathcal{R} g \iff \text{Para todo } n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \text{ existe } N \in \mathbb{N}, N \geq 1 \text{ tal que } g(n) = Nf(n).$$

a) Demostrar que es una relación de orden.

b) ¿Se trata de un orden total? ¿Con qué funciones está relacionada la función identidad  $f(n) = n$ ?  
¿Y la función constante  $f(n) = 3$ ?

c) ¿Existen elementos minimales? ¿Y elementos maximales?

16. Sea  $X$  el conjunto de listas formadas por reordenaciones de 1, 2, 3. Por ejemplo,  $[1, 2, 3] \in X, [3, 1, 2] \in X$ , etc. Decimos que  $[a, b, c] \mathcal{R} [d, e, f]$  si  $F(x_a, x_b, x_c) = F(x_d, x_e, x_f)$  donde  $F$  es la función

$$F(x, y, z) = (x - y)(z - x)(y - z).$$

Demostrar que  $\mathcal{R}$  define una relación de equivalencia en  $X$  y hallar el número de clases de equivalencia.

17. Se considera el subconjunto  $A$  del cuerpo  $\mathbb{C}$ , que consiste de todas las sumas finitas de la forma  $\sum_k a_k e^{\pi i r_k}$  donde  $a_k \in \mathbb{Z}, r_k \in \mathbb{Q}$ .

a) Demostrar que  $A$  es un anillo.

b) Demostrar que  $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in A$ .

c) Calcular los cardinales de los siguientes conjuntos:  $A, A[X], \mathbb{C} \setminus A$ . Decidir si son anillos (respecto de la operaciones usuales de la suma y el producto en  $\mathbb{C}$ ).

18. Suponer dada en un conjunto  $A$  una relación  $x \mathcal{R} y$  que tiene las propiedades *reflexiva* y *transitiva*, pero que *ni es simétrica, ni anti-simétrica*. Probar las siguientes afirmaciones:

(a) la relación  $\mathcal{E}$  definida por:  $x \mathcal{E} y \iff x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} x$ , es de equivalencia;

(b) en el conjunto cociente  $A/\mathcal{E}$ , la relación  $\mathcal{S}$  definida por:  $\bar{x} \mathcal{S} \bar{y} \iff x \mathcal{R} y$ , es de orden;

(c) en el anillo de polinomios  $\mathbb{K}[X]$ , la relación:  $Q(X)$  **divide a**  $P(x)$  tiene las propiedades postuladas para  $\mathcal{R}$ , y en cada clase  $\bar{P} \in \mathbb{K}[X]/\mathcal{E}$ , con  $P \neq 0$ , de la relación definida en (a), hay exactamente un *polinomio mónico*, si  $\mathbb{K}$  es un cuerpo.

19. Llamemos  $p_d(n)$  al número de puntos  $(k_1, \dots, k_d) \in \mathbb{N}^d$  cuyas coordenadas cumplen:  $\sum_j k_j = n$ .

(a) Probar que:  $p_{d+1}(n) = \sum_{k=0}^n p_d(k)$ . *Sugerencia:*  $k_{d+1}$  tomará algún valor  $\in [0, n]$ .

(b) Por inducción sobre  $d$ , probar que  $p_d(n)$  es un polinomio en  $n$ , con  $p_d(0) = 1$  y grado  $= d - 1$ . Deducir fórmulas para cada  $p_d(x)$ , con  $d \leq 4$ .