

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

---

RESÚMENES Y REPRESENTACIONES DE MUESTRAS

1. Determina razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
  - a) Si añadimos 7 a todos los datos de una muestra, el primer cuartil aumenta en 7 unidades y el rango intercuartílico no cambia.
  - b) Al restar 1 a cada dato de una muestra, la desviación típica siempre disminuye.
  - c) Si cambiamos el signo de todos los datos de una muestra, el coeficiente de asimetría también cambia de signo.
  - d) Al multiplicar por 3 todos los datos de una muestra, el coeficiente de asimetría no varía.
  - e) Si a una muestra de datos con media  $\bar{x}$  se le añade un nuevo dato que coincide con  $\bar{x}$ , la media no cambia y la desviación típica disminuye.

2. La media de las variaciones mensuales del PIB de la Comunidad de Murcia de los nueve primeros meses del año ha sido del 0.1%. ¿Cuál debe ser la media de los últimos tres meses para que la media anual cumpla el objetivo del 0.2%?

3. En 1798 el científico inglés Henry Cavendish midió la densidad de la Tierra haciendo un cuidadoso experimento con una balanza de torsión. He aquí sus 29 medidas de la densidad de la Tierra respecto de la del agua (realizadas con el mismo instrumento):

5.50 5.61 4.88 5.07 5.26 5.55 5.36 5.29 5.58 5.65 5.57 5.53 5.62 5.29 5.44  
5.34 5.79 5.10 5.27 5.39 5.42 5.47 5.63 5.34 5.46 5.30 5.75 5.68 5.85

- a) Halla la mediana, los cuartiles, el rango total y el rango intercuartílico.
  - b) Dibuja un histograma con estos datos. ¿Es una distribución simétrica? ¿Hay algún valor atípico?
  - c) La media de las 29 medidas es la mejor estimación de Cavendish de la densidad de la Tierra. Encuéntrese esta media y la desviación estándar.
4. Un investigador de una piscifactoría recopiló los siguientes datos sobre la longitud de las carpas hembras de 6 años (en milímetros):

217	230	220	221	225	223	219	217	225	228	234	222	231
222	220	222	222	223	225	214	221	233	227	234	223	225
253	220	213	224	235	283	210	218	235	231			

Agrupa los datos en 5 clases de 15 mm de anchura, comenzando en 210. Dibuja el histograma correspondiente. Calcula la media y desviación estándar. ¿Hay algún valor atípico? Si los eliminamos, calcula la nueva media.

5. En 1879 Michelson obtuvo los siguientes valores para la velocidad de la luz en el aire (se dan los resultados restando 299.000 a los datos originales, en km./sg.):

850, 740, 900, 1070, 930, 850, 950, 980, 980, 880, 1000, 980, 930, 650, 760.

En 1882 Newcomb, utilizando otro procedimiento, obtuvo (restando de nuevo 299.000):

883, 816, 778, 796, 682, 711, 611, 599, 1051, 781, 578, 796, 774, 820, 771.

Dibuja histogramas para ambas distribuciones. Calcula las medias y desviaciones típicas. ¿Qué conclusiones pueden extraerse?

---

## CORRELACIONES, COVARIANZAS Y RECTA DE REGRESIÓN

- 6.** En un experimento sobre la ley de Hooke se colocaron pesos de varios tamaños en el extremo de una cuerda de piano. La tabla de la derecha da los pesos colocados y la longitud que adquirió la cuerda. Calcula el coeficiente de correlación y la recta de regresión. ¿Cuál es el error cuadrático medio de los datos?

Peso (kg)	Longitud (cm)
0	439.00
2	439.12
4	439.21
6	439.31
8	439.40
10	439.50

- 7.** Una empresa quiere conocer la relación entre el tamaño de su equipo de ventas y sus ingresos anuales (en millones de pesetas). Se examinan las cifras de los 10 últimos años, obteniéndose los datos siguientes:

Año	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Plantilla	15	18	24	22	25	29	30	32	35	38
Ventas	13.5	16.3	23.3	24.1	26.3	29.3	34.1	32.6	36.3	41.5

- a) Haz una nube de puntos con estos datos ( $X$  = plantilla,  $Y$  = ventas). ¿Hay una relación lineal entre ellos?

- b) Calcula el coeficiente de correlación y halla la recta de regresión de  $Y$  sobre  $X$ .

- 8.** La mortalidad infantil (muertes por mil partos) en España durante los años 2008-2012 fue (tomando 2010 como año 0):

$X$ : año	-2	-1	0	1	2
$Y$ : mortandad	14.5	13.8	12.7	11.9	11.4

- a) Ajusta estos datos a una ecuación de la forma  $Y = a e^{bX}$ .

- b) Calcula el coeficiente de correlación y comenta la bondad del ajuste.

- c) ¿Qué mortalidad infantil se espera para 2020 (año 10) si se da por bueno el ajuste anterior?

- 9.** En la tabla se recogen medidas (bajo ciertas condiciones) del volumen de un determinado gas al someterlo a distintas presiones:

P presión	1	1.5	2	2.5	3
V volumen	1	0.76	0.62	0.52	0.46

- a) Ajusta estos datos a una ecuación de la forma  $V = a P^b$ .

- b) Calcula el coeficiente de correlación y comenta la bondad del ajuste.

- c) ¿Qué volumen corresponde a  $P = 3.5$  si se da por bueno el ajuste anterior?

- d) Representa gráficamente los puntos de la muestra y la función de ajuste obtenida.

---

## EJERCICIOS DE ORDENADOR

- 10.** En la hoja de cálculo **datos-hoja-ej1.xls** encontrarás unas cuantas series de datos y unas cuantas cuestiones de Estadística descriptiva para cada una de ellas. El objetivo es que utilices excel para darles respuesta.