Hoja 7: Polinomios de Taylor

1.- Halla el polinomio de Taylor de grado 4 de las siguientes funciones:

(a) $f(x) = \cos x$ en $a = \frac{\pi}{4}$ (b) $f(x) = \ln x$ en $a = 1$ (c) $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$ en $a = 1$

(d) $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ en $a = 0$ (e) $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$ en $a = 0$ (f) $f(x) = \arctan x$ en $a = 0$

(g) $f(x) = x^5$ en $a = 3$ (h) $f(x) = \dfrac{e^x}{1+x^2}$ en $a = 0$ (i) $f(x) = \ln(1+x)$ en $a = 0$

(j) $f(x) = 3 + (x-1) + 2\,(x-1)^2 + 5\,(x-1)^3$ en $a = 0$

2.- Calcula los siguientes límites utilizando el polinomio de Taylor:

$$\lim_{x\to 0} \frac{(x - \operatorname{sen} x)^4}{(\ln(1+x) - x)^6}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^{-x} - 1 + x}{\cos(2\,x) - 1}.$$

3.- Prueba que, para $x > 0$, se cumple que

$$a)\quad 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} \le \sqrt{1+x} \le 1 + \frac{x}{2}.$$

$$b)\quad x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x.$$

$$c)\quad 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \le e^{-x} \le 1 - x + \frac{x^2}{2}.$$

4.- Usando la función $f(x) = \arctan x$, calcula π con un error menor que 10^{-3}.

5.- Calcula $\cos(1)$ con un error menor que 10^{-3}.

6.- Sea f una función 4 veces derivable en un intervalo alrededor del 0. Supongamos que

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - 1 + 3\,x - 5\,x^2}{x^3} = 0.$$

Calcula $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ y $f'''(0)$.